

Διαχείριση αναπαραγωγής αιγο-προβάτων στα Ιόνια νησιά



Δρ Θεοδώρα Τσιλιγιάννη
Διευθύντρια Ερευνών
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ



Μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να βελτιώσουν το αποτέλεσμα

Επιλογή περιόδου τοκετών για τα:

- **Πρώιμα** (άρμεγμα και γάλα για τυροκόμηση – αρνιά και κατσίκια για τα Χριστούγεννα)
- **Όψιμα** (αρνιά και κατσίκια για τις ανάγκες του τουρισμού).

Επιλογή ζώων για τους:

- Πρώιμους τοκετούς (αυτά που έχουν καλύτερη γαλακτοπαραγωγή)
- Όψιμους τοκετούς (ζώα που δε θα είναι έγκυα για τους πρώιμους τοκετούς ή ζώα με μικρότερη γαλακτοπαραγωγή).

Προτεινόμενη μέθοδος επιλογής για το συγχρονισμό των οίστων: η επίδραση του αρσενικού (male effect).

Τι κάνουμε πριν από το μαρκάλο (περίοδος οχείων);

Θηλυκά και Αρσενικά:

- ξεχωρίζουμε τα ζώα για σφαγή και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα αδύνατα ζώα
- γίνονται οι ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ αποπαρασιτισμοί & εμβολιασμοί

Θηλυκά:

- πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 8 εβδομάδες από τον προηγούμενο τοκετό
- χωρίζουμε τα όψιμα από τα πρώιμα

Αρσενικά:

- κόψιμο νυχιών όπου χρειάζεται.

Τι κάνουμε κατά το μαρκάλο (περίοδος οχείων)

Προβατίνες:

- Απομάκρυνση των κριαριών από τις προβατίνες: **50 ημέρες** (7 εβδομάδες) πριν από την περίοδο που θέλουμε μαρκάλο (οχείες). Κατάλληλη διατροφή (καλό τάισμα) των Κριαριών.

- **Εισαγωγή των κριαριών** ξανά στο κοπάδι: **3-4 εβδομάδες πριν από την περίοδο που θέλουμε το μαρκάλο (οχείες)**. Ο μαρκάλος ξεκινά (πρώτος γόνιμος οίστρος - οχεία) περίπου 3 εβδομάδες (18-24 ημέρες) μετά από την εισαγωγή των αρσενικών.

Γίδες:

- **Απομάκρυνση των τράγων** από τις γίδες: **70 ημέρες (10 εβδομάδες)** πριν από την περίοδο που θέλουμε το μαρκάλο (οχείες).

Κατάλληλη διατροφή (καλό τάισμα) των Τράγων.

- **Εισαγωγή των τράγων** ξανά στο κοπάδι: **4-6 εβδομάδες πριν από την περίοδο που θέλουμε το μαρκάλο (οχείες)**. Ο μαρκάλος (πρώτος γόνιμος οίστρος - οχεία) ξεκινά περίπου 4 εβδομάδες (23-30 ημέρες) μετά από την εισαγωγή των αρσενικών.

Παράδειγμα 1: αρνιά ή κατσίκια για σφαγή ηλικίας 10-12 εβδομάδων για τα Χριστούγεννα

	Προβατίνες	Γίδες
Απομάκρυνση αρσενικών	18 Μαρτίου	6 Μαρτίου
Εισαγωγή αρσενικών	15 Απριλίου	10 Απριλίου
Μαρκάλος (οχείες)	μεταξύ 6-16 Μαΐου	μεταξύ 6-16 Μαΐου
Τοκετοί	μεταξύ 1-10 Οκτωβρίου	μεταξύ 1-10 Οκτωβρίου

Παράδειγμα 2: αρνιά για το καλοκαίρι (Ιούνιο – Αύγουστο)

Χωρισμός ζώων σε 2 ομάδες	Ιούνιος	Ιούλιος – Αύγουστος
Απομάκρυνση αρσενικών	16 Σεπτεμβρίου	16 Οκτωβρίου
Εισαγωγή αρσενικών	10 Οκτωβρίου	10 Νοεμβρίου
Μαρκάλος (οχείες)	Νοέμβριο	Δεκέμβριο
Τοκετοί	μεταξύ 1-30 Απριλίου	μεταξύ 1-30 Μαΐου

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα χωρισμού των ζώων σε ομάδες, τότε μπορεί να γίνει μία ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, τα αρνιά που θα είναι διαθέσιμα τον Αύγουστο για σφαγή θα είναι μεγαλύτερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Για έχουμε συγχρονισμό των οίστρων και των τοκετών είναι σημαντικό:

α) τα αρσενικά να μείνουν μακριά από τα θηλυκά για τον προτεινόμενο σε κάθε περίπτωση χρόνο και

β) να ταΐστουν καλά αυτό το διάστημα.

• Αν θέλουμε διαφορετική περίοδο τοκετών, απομακρύνουμε τα αρσενικά νωρίτερα ή αργότερα και τα εισάγουμε στο κοπάδι σύμφωνα με τους προτεινόμενους χρόνους.